



## 封闭液 TBS BSA

货号	规格
BF06089-T-100	100ml
BF06089-T-500	500ml

### 产品介绍

本产品不用稀释直接使用，用于 ELISA、蛋白印迹和免疫组化中封闭之用。也可用于稀释抗体，做抗体稀释液使用时，可根据需要添加 0.05%吐温-20。

### 运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30° C)， 2~8° C 储存，在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

### 使用方法

酶标板的封闭：

1. 将包被抗原或抗体的酶标板吸除包被液。
2. 用洗涤液洗涤 1 次，洗去未结合或结合弱的抗原或抗体。
3. 加入本品，每孔加入量应稍大于包被量。
4. 室温或 37° C 孵育 30 分钟。
5. 如果包被的酶标板不马上使用，可密封酶标板，带着封闭液 2~8° C 储存 2 周内使用，也可甩掉或吸除封闭液，将酶标板孔朝下在干净的吸水纸上拍干水分，真空干燥 2 小时，或在干燥的环境中(建议相对湿度≤15%) 过夜，加干燥剂密封于铝箔袋，2~8° C 冷藏备用，可稳定半年至三年。使用酶标板干燥稳定剂可进一步提高酶标板的稳定性。
6. 洗涤液洗涤后可进行下一步实验。
7. 本产品也可用于稀释抗体或标记物，作为抗体稀释液使用时，可根据需要添加 0.05%吐温-20。

### 注意事项

- 本产品的基质溶液为 0.01M pH7.4 PBS 或 0.05M pH7.4 TBS，含 1%BSA，0.15M NaCl，稳定剂。
- 根据免疫分析需要选择 PBS 和 TBS 系统，如果使用碱性磷酸酶标记，建议选择 TBS 系统。
- 本产品比脱脂奶粉封闭更适合生物素-亲和素系统
- 本产品经过过滤除菌，并添加 0.05%ProClin300 作为防腐剂。